

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Jo + P
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORREZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, ~~PUY-DE-DOME~~, HAUTE-VIENNE)
Régie de Recettes de la D. D. A.

50,00 F

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative, Rue Pélissier
C.C.P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17 63034 CLERMONT-FERRAND CEDEX

DLP 27-5-77119149

BULLETIN N° 75 du 4 Mai 1977.-

V I G N E

BLACK-ROT.-

Les germes de cette maladie étant à maturité, les premières contaminations sont possibles sur les cépages ayant atteint ou dépassé le stade D reproduit au verso.

Dans les Vignes atteintes l'an dernier, ainsi que dans celles se trouvant à proximité de parcelles incultes dans lesquelles la maladie a été précédemment observée, il est recommandé de réaliser un traitement dans les meilleurs délais.

Pour les produits à utiliser consulter la revue PHYTOMA de Février 1977, page 9.

BRENNER.-

Dans les Vignes où cette maladie a pu être observée ces dernières années (les feuilles de la base des rameaux et les inflorescences se dessèchent et tombent dans le courant de l'été) il est conseillé d'effectuer un traitement au stade 2 à 3 feuilles étalées.

Utiliser un produit cuprique, du captafol, du mancozèbe, du mancopper, du manèbe, ou une association de cuivre et de zinèbe.


Clermont-Ferrand, le 4 Mai 1977.

Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire,


A. LECLERC.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DÉPARTEMENT DES PÉRIODIQUES


Stades repères de la vigne




Bourgeon d'hiver



Bourgeon dans le coton




Pointe verte



Sortie des feuilles



Feuilles étalées



Grappes visibles



Grappes séparées



Boutons floraux séparés



Floraison



Nouaison